Produit scalaire de l'espace. Applications.

- 1. Produit scalaire de l'espace..... **p2**
- 2. Équations cartésienne d'un plan..... **p4**
- 3. Perpendiculaire commune à deux droites non
coplanaires..... **p9**

1. Produit scalaire de l'espace

1.1. Introduction

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On choisit A un point de l'espace et les points B et C sont déterminés de manière unique par $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

- Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, le plan $P = (ABC)$ est l'unique plan contenant A ; B et C.
- Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, il existe une infinité de plans contenant les trois points : A ; B et C.
- Le produit scalaire dans l'espace des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est égal au produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ dans le plan P.
- On admet que le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne dépend pas du point A.

1.2. Définition

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de l'espace. On nomme **produit scalaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ égal à :

- 0 si l'un au moins des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est nul.
- $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}; \vec{v})$ si les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls. (l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$ est l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ dans le plan P contenant A;B et C.

1.3. Propriétés

Pour tous vecteurs de l'espace $\vec{u}$; $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et pour tout nombre réel k , on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
- $(k \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k \vec{v}) = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Pour tous vecteurs de l'espace $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

■ $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$

■ $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$ et $(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$

■ $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$ et $(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

$(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace.

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ et $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

1.4. Exemples

ABCD A'B'C'D' est un cube et $AB = a$ (a est un réel strictement positif).

Calculer les produits scalaires suivants :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} ; \quad \vec{AC} \cdot \vec{AC}' ; \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC}' \quad \text{et} \quad \vec{AC} \cdot \vec{AD}'$$

$P=(ABC)$

B est le projeté orthogonal de C sur (AB), donc $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = \vec{AB}^2 = \|\vec{AB}\|^2 = AB^2 = a^2$.

$P=(ACC')$

C est le projeté orthogonal de C' sur (AC), donc $\vec{AC} \cdot \vec{AC}' = \vec{AC} \cdot \vec{AC} = \vec{AC}^2 = \|\vec{AC}\|^2 = AC^2 = (\sqrt{2}a)^2 = 2a^2$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC}' = \vec{AB} \cdot (\vec{AC} + \vec{CC}') = \vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AB} \cdot \vec{CC}'$$

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CC}'$ sont orthogonaux donc $\vec{AB} \cdot \vec{CC}' = 0$

Donc, $\vec{AB} \cdot \vec{AC}' = \vec{AB} \cdot \vec{AC} = a^2$

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD}' = \vec{AC} \cdot (\vec{AD} + \vec{DD}') = \vec{AC} \cdot \vec{AD} + \vec{AC} \cdot \vec{DD}' = \vec{AC} \cdot \vec{AD} + 0 = a^2$$

Pour calculer les produits scalaires demandés, on peut aussi utiliser un repère orthonormé.

2. Équation cartésienne d'un plan

2.1. Démonstration d'une propriété

Propriété : Si une droite D est **orthogonale à deux droites sécantes** contenues dans le plan P alors la droite D est **orthogonale à toute droite contenue dans le plan P**.

Démonstration :

d_1 et d_2 sont deux droites sécantes en I contenues dans le plan P.

$\vec{u}_1$ est un vecteur directeur de d_1 .

$\vec{u}_2$ est un vecteur directeur de d_2 .

$\vec{v}$ est un vecteur directeur de D.

D est orthogonale à d_1 et d_2 , donc $\vec{u}_1 \cdot \vec{v} = 0$ et $\vec{u}_2 \cdot \vec{v} = 0$

Soit Δ une droite contenue dans P . $\vec{w}$ est un vecteur directeur de Δ .

Les vecteurs $\vec{u}_1; \vec{u}_2$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.

Les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ ne sont pas colinéaires (car les droites d_1 et d_2 sont sécantes) donc $\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$.

C'est à dire, il existe deux réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2$

$$\vec{w} \cdot \vec{v} = (a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2) \cdot \vec{v} = (a\vec{u}_1) \cdot \vec{v} + (b\vec{u}_2) \cdot \vec{v} = a(\vec{u}_1 \cdot \vec{v}) + b(\vec{u}_2 \cdot \vec{v}) = a \times 0 + b \times 0 = 0$$

Donc les vecteurs $\vec{w}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et les droites Δ et D sont orthogonales.

2.2. Définition

P est le plan passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

On nomme **vecteur normal** au plan P tout vecteur non nul $\vec{n}$ orthogonal à tout vecteur du plan P .

2.3. Remarque

$\vec{n}$ est un vecteur normal au plan P si et seulement si $\vec{n}$ est orthogonal aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

2.4. Détermination de l'ensemble des vecteurs normaux à un plan

$(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace.

a) *Exemple 1*

P est le plan passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On vérifie que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

$$\vec{u} = \lambda \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 5\lambda \\ -2 = 2\lambda \\ 3 = -\lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{5} \\ \lambda = -1 \\ \lambda = -3 \end{cases}$$

Donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est normal au plan P si et seulement si :

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2b + 3c = 0 \\ 5a + 2b - c = 0 \end{cases}$$

On doit résoudre un système de 2 équations à 3 inconnues.

Pour cela, la méthode est de choisir 2 inconnues et la troisième joue le rôle de paramètre.

$$\begin{cases} a - 2b = -3c \\ 5a + 2b = c \end{cases}$$

On obtient $6a = -2c$ soit $a = -\frac{1}{3}c$ et $12b = 16c$ soit $b = \frac{16}{12}c = \frac{4}{3}c$.

$$\vec{n}_c \left(-\frac{1}{3}c; \frac{4}{3}c; c \right)$$

Pour $c = 0$, on obtient le vecteur nul.

L'ensemble des vecteurs normaux au plan P est l'ensemble des vecteurs non nuls colinéaires au vecteur

$$\vec{N} \left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; 1 \right).$$

Pour $c = 3$, $\vec{n}_3(-1; 4; 1)$ est un vecteur normal au plan P.

Il n'est pas nécessaire de connaître les coordonnées du point A pour déterminer les vecteurs normaux à P.

b) Exemple 2

P est le plan passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

On vérifie que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

$$\vec{u} = \lambda \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = -4\lambda \\ 1 = -2\lambda \\ -2 = 5\lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{2}{5} \end{cases}$$

Donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est normal au plan P si et seulement si :

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b - 2c = 0 \\ -4a - 2b + 5c = 0 \end{cases}$$

On ne peut pas choisir a et b pour inconnues et les exprimer en fonction de c , mais on peut choisir a et c comme inconnues et b comme paramètre.

$$\begin{cases} 2a - 2c = -b \\ -4a + 5c = 2b \end{cases}$$

On obtient $c=0$ et $a=-\frac{1}{2}b$

$$\vec{n}_b \left(-\frac{1}{2}b; b; 0 \right)$$

Pour $b=0$, on obtient le vecteur nul.

L'ensemble des vecteurs normaux au plan P est l'ensemble des vecteurs non nuls colinéaires au vecteur

$$\vec{N} \left(-\frac{1}{2}; 1; 0 \right).$$

Pour $b=2$, $\vec{n}_2(-1; 2; 0)$ est un vecteur normal au plan P.

On admet qu'il existe une infinité de vecteurs normaux à un plan donné et que tous ces vecteurs sont colinéaires.

2.5. Équation cartésienne d'un plan

a) *Remarque*

Soit $\vec{n}$ un vecteur normal au plan P passant par A.

M appartient au plan P si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$

b) *Théorème*

$(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace.

Si π est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ alors **une équation cartésienne du plan P** est une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ (avec d nombre réel).

Démonstration :

$$A(x_0; y_0; z_0) \text{ et } M(x; y; z)$$

M appartient au plan P si et seulement si :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + cz - (ax_0 + by_0 + cz_0) = 0$$

On pose $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$

$$\Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0$$

c) Réciproquement

$$a \in \mathbb{R}; b \in \mathbb{R}; c \in \mathbb{R}; d \in \mathbb{R}$$

Si $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$ alors :

L'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est **un plan de**

vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Démonstration :

On détermine les coordonnées d'un point A telles que $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$.

Par exemple, si $a \neq 0$ alors on pose $y_0 = z_0 = 0$ et $x_0 = -\frac{d}{a}$.

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \{ a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 \text{ avec } \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow M \text{ appartient au plan}$$

passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

2.6. Projeté orthogonal d'un point de l'espace sur une droite

$(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace.

$A(1; -2; 2)$. d est la droite passant par $B(5; 4; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Le projeté orthogonal du point A sur la droite d est le point d'intersection H de la droite d et du plan P passant par A et de vecteur normal $\vec{u}$.

La représentation paramétrique de d est
$$\begin{cases} x = 5 + 5t \\ y = 4 + t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Recherche de l'équation cartésienne de P :

$$M(x; y; z) \quad A(1; -2; 2) \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$M \in P \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 5(x-1) + (y+2) - (z-2) = 0 \Leftrightarrow 5x + y - z - 1 = 0$$

On détermine l'intersection de la droite d et du plan P

$$\begin{cases} x = 5 + 5t \\ y = 4 + t \\ z = 3 - t \\ 5x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$5(5 + 5t) + (4 + t) - (3 - t) - 1 = 0$$

$$25 + 25t + 4 + t - 3 + t - 1 = 0$$

$$27t + 25 = 0$$

$$t = -\frac{25}{27}$$

$$x_H = 5 - 5 \times \frac{25}{27} = \frac{10}{27}$$

$$y_H = 4 - \frac{25}{27} = \frac{83}{27}$$

$$z_H = 3 + \frac{25}{27} = \frac{106}{27}$$

Donc $H\left(\frac{10}{27}, \frac{83}{27}, \frac{106}{27}\right)$

2.7. Plans perpendiculaires

P est un plan de vecteur normal $\vec{n}$.

P' est un plan de vecteur normal $\vec{n}'$

Les plans P et P' sont **perpendiculaires** si et seulement si les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont **orthogonaux**.

3. Perpendiculaire commune à deux droites non coplanaires

On veut démontrer le résultat suivant :

Si d_1 et d_2 sont **deux droites non coplanaires** alors il existe une **unique** droite D **perpendiculaire** à d_1 et d_2 .

Démonstration :

Rappel : Deux droites perpendiculaires sont deux droites orthogonales et sécantes.

Pour résoudre ce problème, on propose de procéder par analyse et synthèse.

Analyse

On suppose le problème résolu, c'est à dire il existe D sécante en H_1 à d_1 et en H_2 à D_2 et orthogonale à d_1 et d_2 .

d_1 est la droite passant par A_1 et de vecteur directeur $\vec{u}_1$.

d_2 est la droite passant par A_2 et de vecteur directeur $\vec{u}_2$.

d'_1 est la droite passant par H_2 et parallèle à d_1 .

d'_2 est la droite passant par H_1 et parallèle à d_2 .

$$D = (H_1 H_2)$$

$\vec{H_1 H_2}$ est un vecteur normal au plan P_1 passant par A_1 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$.

$\vec{H_1 H_2}$ est un vecteur normal au plan P_2 passant par A_2 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$.

Π_1 est le plan contenant d_1 et d'_1 c'est à dire le plan contenant d_1 et perpendiculaire aux plans P_1 et P_2 ou c'est à dire le plan passant par A_1 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{n}$ (vecteur normal à P_1 et P_2).

Π_2 est le plan contenant d_2 et d'_2 c'est à dire le plan contenant d_2 et perpendiculaire aux plans P_1 et P_2 ou c'est à dire le plan passant par A_2 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_2$ et $\vec{n}$ (vecteur normal à P_1 et P_2).

Synthèse

d_1 et d_2 sont données non coplanaires donc $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ ne sont pas colinéaires.

Π_1 est le plan passant par A_1 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{n}$.

Π_1 contient la droite D_1 passant par A_1 et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Π_2 est le plan passant par A_2 et de vecteurs directeurs $\vec{u}_2$ et $\vec{n}$.

Π_2 contient la droite D_2 passant par A_2 et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Π_1 et Π_2 sont deux plans sécants car les vecteurs $\vec{n}$; $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ ne sont pas coplanaires.

Soit D la droite d'intersection des plans Π_1 et Π_2 .

D_1 est contenue dans Π_1 et D_2 est contenue dans Π_2 et D_1 et D_2 sont parallèles ; le théorème du toit nous permet de conclure que la droite D d'intersection de Π_1 et Π_2 est parallèle à D_1 et D_2 donc de vecteur directeur $\vec{n}$.

Les vecteurs $\vec{n}$; $\vec{u}_1$; $\vec{u}_2$ ne sont pas coplanaires donc d_2 est sécante à Π_1 en H_2 et d_2 est contenue dans Π_2 donc $H_2 \in D$.

Les vecteurs $\vec{n}$; $\vec{u}_1$; $\vec{u}_2$ ne sont pas coplanaires donc d_1 est sécante à Π_2 en H_1 et d_1 est contenue dans Π_1 donc $H_1 \in D$.

Conclusion :

D est orthogonale à d_1 et d_2 (car $\vec{n}$ est un vecteur directeur de D), D est sécante à d_1 en H_1 et à d_2 en H_2 .

D est donc la perpendiculaire commune à d_1 et d_2 .