Probabilités conditionnelles

1. Notions de probabilités conditionnelles.....	p2	4. Théorème.....	p7
2. Probabilités conditionnelles.....	p5	5. Généralisation.....	p7
3. Formule des probabilités totales.....	p6		

1. Notions de probabilités conditionnelles

1.1. Exemple 1

a) On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes.

Card $\Omega=32$

Il y a 32 éventualités que l'on peut noter :

$7_t; 8_t; 9_t; 10_t; V_t; D_t; R_t; A_t$ les 8 trèfles ; $7_p; \dots; A_p$ les 8 piques ; $7_c; \dots; A_c$ les 8 cœur, $7_{ca}; \dots; A_{ca}$ les 8 carreaux.

Le tirage est effectué au hasard donc la loi est équirépartie.

Soit R l'événement : on tire un roi. $P(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$

Soit T l'événement : on tire un trèfle. $P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$

$R \cap T = \{R_t\}$. $P(R \cap T) = \frac{1}{32}$

b) On arrive maintenant à savoir avant de découvrir la carte qu'il s'agit d'un trèfle.

On note (R/T) l'événement : tirer un roi **sachant** que l'on a tiré un trèfle.

$$P(R/T) = \frac{1}{8}$$

On peut remarquer que $\frac{P(R \cap T)}{P(T)} = \frac{\frac{1}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = P(R/T)$

c) On arrive maintenant à savoir avant de découvrir la carte qu'il s'agit d'un roi.

On note (T/R) l'événement : tirer un trèfle **sachant** que l'on a tiré un roi.

$$P(T/R) = \frac{1}{4}$$

On peut remarquer que $\frac{P(T \cap R)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{32}}{\frac{1}{8}} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} = P(T/R)$

1.2. Exemple 2

Dans une urne, on dispose 7 boules rouges, 4 boules noires et 2 boules vertes. On tire successivement et au hasard deux boules de l'urne sans remise.

En différenciant les 13 boules par exemple : $r_1; r_2; r_3; r_4; r_5; r_6; r_7; n_8; n_9; n_{10}; n_{11}; v_{12}; v_{13}$, une éventualité est alors une 2-liste d'éléments deux à deux distincts d'un ensemble de 13 éléments, donc :

$$\text{Card } \Omega = \frac{13!}{(13-2)!} = 12 \times 13 = 156$$

Les tirages sont effectués au hasard donc la loi est équirépartie.

Pour i égal 1 ou 2, on note :

R_i l'événement : tirer une boule rouge au $i^{\text{ème}}$ tirage.

N_i l'événement : tirer une boule noire au $i^{\text{ème}}$ tirage.

V_i l'événement : tirer une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage.

R_1 : il faut tirer au premier tirage une boule rouge parmi les 7 boules rouges et au deuxième tirage une boule parmi les 12 restantes.

$$\text{Card } R_1 = 7 \times 12$$

$$P(R_1) = \frac{7 \times 12}{12 \times 13} = \frac{7}{13}$$

(On obtient la probabilité d'obtenir une boule rouge avec un seul tirage).

Même raisonnement pour N_1 et V_1 .

$$\text{Card } R_1 = 7 \times 12$$

$$P(R_1) = \frac{7 \times 12}{12 \times 13} = \frac{7}{13}$$

$$\text{Card } N_1 = 4 \times 12$$

$$P(R_1) = \frac{4 \times 12}{12 \times 13} = \frac{4}{13}$$

$$\text{Card } V_1 = 2 \times 12$$

$$P(V_1) = \frac{2 \times 12}{12 \times 13} = \frac{2}{13}$$

Ce raisonnement ne permet pas de calculer R_2 ou N_2 ou V_2 .

$V_1 \cap R_2$: il faut tirer au premier tirage une boule verte parmi les 2 boules vertes et au deuxième tirage une boule rouge parmi les 7 boules rouges.

$$\text{Card } V_1 \cap R_2 = 2 \times 7$$

$$P(V_1 \cap R_2) = \frac{14}{12 \times 13} = \frac{7}{78}$$

De même,

$$\text{Card } N_1 \cap R_2 = 4 \times 7$$

$$P(N_1 \cap R_2) = \frac{28}{12 \times 13} = \frac{7}{39}$$

$R_1 \cap R_2$: il faut tirer au premier tirage une boule rouge parmi les 7 boules rouges et au deuxième tirage une boule rouge parmi les 6 boules rouges restantes dans l'urne.

$$\text{Card } R_1 \cap R_2 = 7 \times 6$$

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{42}{12 \times 13} = \frac{7}{26}$$

$V_1 \cap R_2 \cup N_1 \cap R_2 \cup R_1 \cap R_2$: au premier tirage, on obtient une boule quelconque parmi les 13 de l'urne et au deuxième tirage, on obtient une boule rouge, donc :

$$V_1 \cap R_2 \cup N_1 \cap R_2 \cup R_1 \cap R_2 = R_2$$

Les événements $V_1 \cap R_2$; $N_1 \cap R_2$ et $R_1 \cap R_2$ sont incompatibles deux à deux, donc :

$$P(R_2) = P(V_1 \cap R_2) + P(N_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap R_2) = \frac{7}{78} + \frac{7}{39} + \frac{7}{26} = \frac{7}{13}$$

(on remarque que la probabilité de tirer une boule rouge au deuxième tirage est égale à la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage)

$P(R_2 / N_1)$ est la probabilité de tirer une boule rouge au deuxième tirage **sachant** que l'on a tiré une boule noire au premier tirage.

Pour le deuxième tirage dans l'urne, on a 12 boules dont 7 rouges.

$$P(R_2 / N_1) = \frac{7}{12}$$

De même, $P(R_2 / V_1) = \frac{7}{12}$ et $P(R_2 / R_1) = \frac{6}{12}$.

On peut remarquer que :

$$\frac{P(N_1 \cap R_2)}{P(N_1)} = \frac{\frac{7}{39}}{\frac{4}{13}} = \frac{7}{12} = P(R_2/N_1)$$

$$\frac{P(V_1 \cap R_2)}{P(V_1)} = \frac{\frac{7}{78}}{\frac{2}{13}} = \frac{7}{12} = P(R_2/V_1)$$

$$\frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = \frac{\frac{7}{26}}{\frac{7}{13}} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2} = P(R_2/R_1)$$

On peut aussi remarquer que :

$$\begin{aligned} & P(R_2/N_1) \times P(N_1) + P(R_2/V_1) \times P(V_1) + P(R_2/R_1) \times P(R_1) \\ &= \frac{7}{12} \times \frac{4}{13} + \frac{7}{12} \times \frac{2}{13} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{13} \\ &= \frac{7}{13} = P(R_2) \end{aligned}$$

2. Probabilités conditionnelles

2.1. Définition

P est une probabilité sur Ω .

A et B sont deux événements, la probabilité de B est non nulle.

La probabilité de A sachant que B est réalisé (on dit A sachant B) est le nombre noté

$P_B(A)$ ou $P(A/B)$ défini par :

$$P_B(A) = P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

2.2. Probabilité d'une intersection

P est une probabilité sur Ω .

A et B sont deux événements de probabilités non nulles.

$$P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B) = P(A/B) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A) = P(B/A) \times P(A)$$

Remarque :

$$P(A \cap B) = P(B \cap A), \text{ mais en général } P(A/B) \neq P(B/A)$$

Utilisation d'un arbre pondéré

Le chemin en rouge représente l'événement $A \cap B$.

La probabilité de ce chemin (ou de l'événement $A \cap B$) est le produit des probabilités de ses branches.

3. Formules des probabilités totales

3.1. Définition

$B_1; B_2$ et B_3 sont des événements de Ω .

On dit que $B_1; B_2$ et B_3 forment **une partition** de Ω si et seulement si :

$$B_1 \neq \emptyset \text{ et } B_2 \neq \emptyset \text{ et } B_3 \neq \emptyset$$

$$B_1 \cap B_2 = \emptyset \text{ et } B_1 \cap B_3 = \emptyset \text{ et } B_2 \cap B_3 = \emptyset$$

$$B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega$$

3.2. Exemple

Dans l'exemple 2 du premier paragraphe, $N_1; V_1$ et R_1 forment une partition de Ω .

3.3. Généralisation

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

$B_1; B_2; \dots; B_n$ sont n événements de Ω .

On dit que $B_1; B_2; \dots; B_n$ forment **une partition** de Ω si et seulement si :

Pour tout $i \in \{1; 2; \dots; \dots; n\}$, $B_i \neq \emptyset$

Pour tout i et j distincts appartenant à $\{1; 2; \dots; n\}$, on a $B_i \cap B_j = \emptyset$

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$$

4. Théorème

Formules de probabilités totales :

Si $B_1; B_2$ et B_3 forment une partition de Ω et si A est un événement de Ω alors :

$$P(A) = P(A/B_1) \times P(B_1) + P(A/B_2) \times P(B_2) + P(A/B_3) \times P(B_3)$$

Démonstration :

Il suffit de vérifier que :

$$A = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup (B_3 \cap A)$$

Utilisation d'un arbre pondéré :

5. Généralisation

Formules de probabilités totales :

Si $B_1; B_2; \dots; B_n$ forment une partition de Ω et si A est un événement de Ω alors :

$$P(A) = P(A/B_1) \times P(B_1) + P(A/B_2) \times P(B_2) + \dots + P(A/B_n) \times P(B_n)$$