Exercice 3
6 points

Pour tout entier naturel n , on définit la fonction f_n pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par : $f_n(x) = x + e^{n(x-1)}$. On note $\mathcal{C}_n$ la représentation graphique de la fonction f_n dans un repère orthogonal. Quelques-unes des courbes $\mathcal{C}_n$ sont représentées ci-dessous.

Partie A : généralités sur les fonctions f_n

- Démontrer que, pour tout entier naturel n , la fonction f_n est croissante et positive sur l'intervalle $[0; 1]$.
- Montrer que les courbes $\mathcal{C}_n$ ont toutes un point commun A, et préciser ses coordonnées.
- A l'aide des représentations graphiques, peut-on conjecturer le comportement des coefficients directeurs des tangentes en A aux courbes $\mathcal{C}_n$ pour les grandes valeurs de n ? Démontrer cette conjecture.

Partie B : évolution de $f_n(x)$ lorsque x est fixé

Soit x un réel fixé de l'intervalle $[0; 1]$. Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = f_n(x)$.

- Dans cette question, on suppose que $x = 1$. Étudier la limite éventuelle de la suite (u_n) .
- Dans cette question, on suppose que $0 \leq x < 1$. Étudier la limite éventuelle de la suite (u_n) .

Partie C : aire sous les courbes $\mathcal{C}_n$

Pour tout entier naturel n , on note $\mathcal{A}_n$ l'aire, exprimée en unité d'aire, du domaine situé entre l'axe des abscisses, la courbe $\mathcal{C}_n$ et les droites d'équations respectives $x=0$ et $x=1$.

A partir des représentations graphiques, conjecturer la limite de la suite $(\mathcal{A}_n)$ lorsque l'entier n tend vers $+\infty$, puis démontrer cette conjecture.

Correction :
Partie A : généralités sur les fonctions f_n

1. Pour tout entier naturel n et pour tout nombre réel de l'intervalle $[0; 1]$,

$$f_n(x) = x + e^{n(x-1)}$$

pour $n=0$ $f_0(x) = x + e^0 = x + 1$

f_0 est **croissante et positive** sur $[0; 1]$

pour $n \geq 1$ f_n est **dérivable** sur $[0; 1]$, $f'_n(x) = 1 + n e^{n(x-1)}$

Pour tout x de l'intervalle $[0; 1]$, $n e^{n(x-1)} > 0$

Donc, f_n est **croissante** sur $[0; 1]$

$x \geq 0$ et $e^{n(x-1)} > 0$ donc $f_n(x) > 0$ sur $[0; 1]$

donc, f_n est **positive** sur $[0; 1]$.

2. En considérant la figure donnée dans l'énoncé, on peut conjecturer que les courbes $\mathcal{C}_n$ passent par le point $A(1; 2)$. Il suffit de vérifier cette conjecture.

Pour tout entier naturel n : $f_n(1) = 1 + e^{n(1-1)} = 1 + e^0 = 2$.

Pour tout entier naturel n , la courbe $\mathcal{C}_n$ **passe par le point** $A(1; 2)$

3. Le coefficient directeur de la tangente en A augmente lorsque n augmente, pour n grand ($n=100$ par exemple), on peut conjecturer que la tangente est « presque verticale ».

Le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_n$ en A est : $f'_n(1)$.

Or, $f'_n(1) = 1 + n e^0 = 1 + n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(1) = +\infty$$

La **tangente** en A à la courbe **est voisine d'une tangente verticale lorsque n est très grand.**

Partie B : évolution de $f_n(x)$ lorsque x est fixé

x fixé pour tout entier naturel n : $u_n = f_n(x)$.

1. On suppose $x=1$ alors pour tout entier naturel n : $u_n = f_n(1) = 2$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \underline{2}.$$

2. x fixé et $0 \leq x < 1$

pour tout entier naturel n

$$u_n = f_n(x) = x + e^{n(x-1)}$$

or $x-1 < 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(x-1) = -\infty$ et $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{n(x-1)} = 0$

conséquence

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = x}$$

Partie C : aire sous les courbes $\mathcal{C}_n$

En considérant les différentes courbes sur la figure, on remarque que : $\mathcal{A}_0 = \frac{3}{2}$ U.A. (aire d'un trapèze).

La suite $(\mathcal{A}_n)$ est **décroissante**.

La limite de la suite $(\mathcal{A}_n)$ est l'aire du triangle délimité par l'axe des abscisses, la droite d'équation $y=x$ et la

droite d'équation $x=1$ soit $\frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$.

Pour justifier cette conjecture on joint une figure représentant $\mathcal{A}_{100}$

$$\mathcal{A}_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

Pour calculer $\mathcal{A}_n$, il suffit de déterminer une primitive de f_n sur $[0;1]$

$$f_n(x) = x + e^{n(x-1)}$$

$$F_n(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{e^{n(x-1)}}{n}$$

F_n est **une primitive** de f_n sur $[0;1]$

$$\mathcal{A}_n = F(1) - F(0) = \frac{1}{2} + \frac{e^0}{n} - \frac{0}{2} - \frac{e^{-n}}{n}$$

$$\mathcal{A}_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} - \frac{e^{-n}}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-n}}{n} = 0$$

Donc, $\frac{1}{2}$ est **la limite** de $\mathcal{A}_n$ lorsque n tend vers $+\infty$.