Exercice 2
6 points

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-\infty; 1[$ par : $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$.

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

On appelle $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1.a. Déterminer la limite de f en 1.

1.b. En déduire une interprétation graphique.

2. Déterminer la limite de f en $-\infty$.

3.a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a : $f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

3.b. Dresser, en justifiant, le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

4. On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a : $f''(x) = \frac{(x^2 - 4x + 5)e^x}{(x-1)^3}$.

4.a. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

4.b. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

4.c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a : $e^x \geq (-2x-1)(x-1)$.

5.a. Justifier que l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

5.b. À l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} .

CORRECTION

1.a. $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$ x appartient à l'intervalle $] -\infty; 1[$.

On a $x < 1$ donc $x-1 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1} e^x = e^1 > 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$.

1.b. La droite d'équation $x=1$ est une asymptote verticale à la courbe représentative de $f : \mathcal{C}$.

2. $f(x) = e^x \times \frac{1}{x-1}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-1} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

La droite d'équation $y=0$ est une asymptote horizontale en $-\infty$.

3.a. $f = \frac{u}{v}$ $f' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$

$u(x) = e^x$ $u'(x) = e^x$ $v(x) = x-1$ $v'(x) = 1$

$f'(x) = \frac{(x-1)e^x - 1 \times e^x}{(x-1)^2} = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

3.b. Pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $] -\infty; 1[$, on a : $x-2 < 0$, $e^x > 0$ et $(x-1)^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$ et f est strictement décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$.

Tableau de variation de f

x	$-\infty$	1
$f'(x)$	-	
$f(x)$	0	$-\infty$

4. On admet que $f''(x) = \frac{(x^2 - 4x + 5)e^x}{(x-1)^3}$, pour tout x de l'intervalle $] -\infty; 1[$.

4.a. $T(x) = x^2 - 4x + 5$ $\Delta = 16 - 4 \times 1 \times 4 = -4 < 0$

Pour tout x de l'intervalle $] -\infty; 1[$, $T(x) > 0$ et $e^x > 0$ et $(x-1)^3 < 0$ donc $f''(x) < 0$.

f est une fonction concave sur $] -\infty; 1[$.

4.b. T est la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0 , $f(0) = \frac{e^0}{0-1} = -1$ donc $A(0; -1)$.

Le coefficient directeur de T est $f'(0) = \frac{-2e^0}{(0-1)^2} = -2$, l'abscisse à l'origine de T est : $f(0) = -1$.

$T: y = -2x - 1$

4.c. f est concave sur $] -\infty; 1[$ donc $\mathcal{C}$ est en dessous de toutes ses tangentes sur $] -\infty; 1[$ en particulier $\mathcal{C}$ est en dessous de T et pour tout x de l'intervalle $] -\infty; 1[$, on a :

$f(x) \leq -2x - 1 \Leftrightarrow \frac{e^x}{x-1} \leq -2x - 1 \Leftrightarrow e^x \geq (-2x - 1)(x-1)$ (car $x-1 < 0$)

5.a. f est dérivable (donc continue) et strictement décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$ à valeurs dans $] -\infty; 0[$, -2 appartient à l'intervalle $] -\infty; 0[$ donc le théorème des valeurs intermédiaires nous permet d'affirmer que -2 admet un unique antécédent α par f appartenant à l'intervalle $] -\infty; 1[$ c'est à dire que l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution α appartenant à l'intervalle $] -\infty; 1[$.

5.b. $f(0) = -1$ donc $0 < \alpha < 1$.

Par balayage on obtient :

$f(0,31) \simeq -1,98 > -2$ $f(0,32) \simeq -2,03 < -2$

Donc $0,31 < \alpha < 0,32$

On joint une figure , non demandée mais que l'on obtient facilement sur la calculatrice.