Exercice 3

5 points

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{6}{1+5e^{-x}}$.

On a représenté sur le schéma ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f .

1. Montrer que le point A de coordonnées $(\ln 5; 3)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$.

2. Montrer que la droite d'équation $y=6$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$.

3.a. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

Montrer que pour tout réel x on a : $f'(x) = \frac{30e^{-x}}{(1+5e^{-x})^2}$.

3.b. En déduire le tableau de variation complet de f sur $\mathbb{R}$.

4. On admet que :

• f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, on note f'' sa dérivée seconde ;

• pour tout réel x , $f''(x) = \frac{30e^{-x}(5e^{-x}+1)}{(1+5e^{-x})^3}$.

4.a. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

On montrera en particulier que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion.

4.b. Justifier que pour tout réel x appartenant à $]-\infty; \ln 5]$, $f(x) \geq \frac{5}{6}x + 1$.

5. On considère une fonction F_k définie sur $\mathbb{R}$ par : $F_k(x) = k \ln(e^x + 5)$
où k est une constante réelle.

5.a. Déterminer la valeur du réel k de sorte que F_k soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

5.b. En déduire que l'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 5$ est égale à $6 \ln\left(\frac{5}{3}\right)$.

Partie B

L'objet de cette partie est d'étudier l'équation différentielle suivante :

(E): $y' = y - \frac{1}{6}y^2$.

On rappelle qu'une solution de (E) est une fonction u définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle

que pour tout x réel, on a : $u'(x) = u(x) - \frac{1}{6}[u(x)]^2$.

1. Montrer que la fonction f définie dans la partie A est une solution de l'équation différentielle (E).

2. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -y + \frac{1}{6}$.

3. On désigne par g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui ne s'annule pas.

On note h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{g(x)}$.

On admet que h est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On note g' et h' les fonctions dérivées de g et h .

3.a. Montrer que si h est solution de l'équation différentielle $y' = -y + \frac{1}{6}$

alors g est solution de l'équation différentielle $y' = y - \frac{1}{6}y^2$.

3.b. Pour tout réel positif m , on considère les fonctions g_m définies sur

$\mathbb{R}$ par : $g_m(x) = \frac{6}{1 + 6me^{-x}}$.

Montrer que pour tout réel positif m , la fonction g_m est solution de

l'équation différentielle (E) : $y' = y - \frac{1}{6}y^2$.

CORRECTION

Partie A

1. Pour tout réel x , $f(x) = \frac{6}{1+5e^{-x}}$ donc $f(\ln(5)) = \frac{6}{1+5e^{-\ln 5}}$ $e^{-\ln 5} = e^{\ln(\frac{1}{5})} = \frac{1}{5}$

$$f(\ln 5) = \frac{6}{1+5 \times \frac{1}{5}} = \frac{6}{2} = 3$$

Le point $A(\ln(5);3)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{6}{1+0} = 6$.

La droite d'équation $y=6$ est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3.a. $u(x) = 1+5e^{-x}$ $u'(x) = 5 \times (-e^{-x}) = -5e^{-x}$

$$f'(x) = 6 \times \frac{-(-5e^{-x})}{(1+5e^{-x})^2} = \frac{30e^{-x}}{(1+5e^{-x})^2}$$

3.b. Pour tout nombre réel x , $e^{-x} > 0$ donc $f'(x) > 0$ et f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$$

$$\text{Conséquence : } \lim_{x \rightarrow -\infty} (1+5e^{-x}) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Tableau de variation de f .

x	$-\infty$	$+\infty$
f'(x)	+	
f(x)	0	6

4.a. $f''(x) = \frac{30e^{-x}(5e^{-x}+1)}{(1+5e^{-x})^3}$

Pour tout réel x , $1+5e^{-x} > 0$ donc $\frac{30e^{-x}}{(1+5e^{-x})^3} > 0$ et le signe de $f''(x)$ est le signe de $5e^{-x}-1$.

$$5e^{-x}-1=0 \Leftrightarrow 5e^{-x}=1 \Leftrightarrow e^{-x}=\frac{1}{5} \Leftrightarrow -x=\ln\left(\frac{1}{5}\right) \Leftrightarrow x=-\ln\left(\frac{1}{5}\right) \Leftrightarrow x=\ln 5$$

$$5e^{-x}-1>0 \Leftrightarrow 5e^{-x}>1 \Leftrightarrow e^{-x}>\frac{1}{5} \Leftrightarrow e^{-x}>e^{\ln(\frac{1}{5})} \Leftrightarrow -x>\ln\left(\frac{1}{5}\right) \Leftrightarrow x<-\ln\left(\frac{1}{5}\right)=\ln 5$$

On donne la convexité de f sous la forme d'un tableau.

x	$-\infty$	$\ln 5$	$+\infty$
f''(x)	+		-
convexité de f	convexe		concave

$f(\ln 5) = 3$ et $f''(\ln 5) = 0$ f'' s'annule en changeant de signe en $\ln 5$ donc le point $A(\ln 5;3)$ est un point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

$$f'(\ln 5) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

La tangente au point A est la droite passant par A et de coefficient directeur $\frac{3}{2}$.

4.b. On a $f(0)=1$, on détermine l'équation réduite de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point de coordonnées (0;1).

$$f'(0) = \frac{30e^0}{(1+5e^0)^2} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6} \text{ et l'ordonnée à l'origine de (T) est : 1.}$$

$$(T): y = \frac{5}{6}x + 1$$

$\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty; \ln 5]$ donc la partie de la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $]-\infty; \ln 5]$ est au dessous de (T) pour x appartenant à $]-\infty; \ln 5]$, $f(x) \geq \frac{5}{6}x + 1$.

5. Pour tout nombre réel x , $F_k(x) = k \ln(e^x + 5)$ k est une constante réelle.

5.a. F_k est dérivable sur $\mathbb{R}$ $(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$F'_k(x) = k \times \frac{e^x}{e^x + 5} = k \times \frac{e^x \times e^{-x}}{(e^x + 5) \times e^{-x}} = k \times \frac{1}{1 + 5e^{-x}}$$

F_k est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout réel x :

$$k \times \frac{1}{1 + 5e^{-x}} = \frac{6}{1 + 5e^{-x}} \Leftrightarrow k = 6$$

F_6 est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

5.b. L'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation : $x = \ln 5$ est $\int_0^{\ln 5} f(x) dx$ car f est continue et positive sur $[0; \ln 5]$.

$$\int_0^{\ln 5} f(x) dx = [F_6(x)]_0^{\ln 5} = [6 \ln(e^x + 5)]_0^{\ln 5} = 6 \ln(5 + 5) - 6 \ln 6 = 6 \ln\left(\frac{10}{6}\right) = 6 \ln\left(\frac{5}{3}\right) \text{ en unité d'aire.}$$

Partie B

1. Pour démontrer que la fonction f est solution de l'équation différentielle (E), il suffit de vérifier que pour tout réel x , on a : $f'(x) = f(x) - \frac{1}{6}(f(x))^2$.

$$f(x) = \frac{6}{1 + 5e^{-x}} \quad \text{et} \quad f'(x) = \frac{30e^{-x}}{(1 + 5e^{-x})^2}$$

$$\text{Or } f(x) - \frac{1}{6}(f(x))^2 = \frac{6}{1 + 5e^{-x}} - \frac{1}{6} \times \frac{36}{(1 + 5e^{-x})^2} = \frac{6(1 + 5e^{-x}) - 6}{(1 + 5e^{-x})^2} = \frac{30e^{-x}}{(1 + 5e^{-x})^2} = f'(x).$$

2. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions f_k définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_k(x) = k e^{ax} - \frac{b}{a} \text{ avec } k \text{ constante réelle.}$$

$$\text{Pour } a=1 \text{ et } b = \frac{1}{6} \quad f_k(x) = k e^{-x} + \frac{1}{6} \text{ avec } k \text{ constante réelle.}$$

3. Pour tout réel x , $g(x) \neq 0$ et $h(x) = \frac{1}{g(x)}$.

3.a. Si h est solution de l'équation différentielle : $y' = -y + \frac{1}{6}$ alors pour tout réel x , on a :

$$h'(x) = -h(x) + \frac{1}{6}.$$

$$h(x) = \frac{1}{g(x)} \quad \text{et} \quad h'(x) = \frac{-g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$\text{donc pour tout réel } x : \frac{-g'(x)}{(g(x))^2} = -\frac{1}{g(x)} + \frac{1}{6} \quad \Leftrightarrow \quad -g'(x) = -g(x) + \frac{1}{6}(g(x))^2$$

$$\Leftrightarrow g'(x) = g(x) - \frac{1}{6}(g(x))^2$$

g est solution de l'équation différentielle (E) $y' = y - \frac{1}{6}y^2$.

3.b. Pour tout nombre réel x et pour nombre réel positif m on a : $g_m(x) = \frac{6}{1+6me^{-x}} \neq 0$.

$$h_m(x) = \frac{1}{g_m(x)} = \frac{1+6me^{-x}}{6} = me^{-x} + \frac{1}{6}$$

$$h'_m(x) = -me^{-x} \quad \text{et} \quad -h_m(x) + \frac{1}{6} = -me^{-x}$$

$$\text{donc } h'_m = -h_m(x) + \frac{1}{6}$$

h_m est solution de l'équation différentielle $y' = -y + \frac{1}{6}$ donc g_m est solution de l'équation :

$$y' = y - \frac{1}{6}y^2.$$